

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА:



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ДЕЙСТВИЕ ВАКЦИНЫ КОНВАСЭЛ®
НАПРАВЛЕНО НА
НУКЛЕОКАПСИДНЫЙ И БЕЛОК
ВИРУСА SARS-COV-2, КОТОРЫЙ
ОСТАЕТСЯ ИДЕНТИЧНЫМ ДЛЯ
ВСЕХ ВАРИАНТОВ ВИРУСА



БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАКЦИНАЦИЯ КОНВАСЭЛ®
ПРИВОДИТ К 100% ВЫРАБОТКЕ
ВЫСОКИХ ТИТРОВ СПЕЦИФИЧЕСКИХ
АНТИТЕЛ КЛАССА IGG К
НУКЛЕОКАПСИДНОМУ БЕЛКУ И
ВИРУСА SARS-COV-2,
СПЕЦИФИЧЕСКОГО КЛЕТОЧНОГО
ИММУНИТЕТА, ПОЛЯРИЗОВАННОГО
ПО БЕЗОПАСНОМУ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ТН1
ПРОФИЛЮ



ИММУНОГЕННОСТЬ

ДОКАЗАННЫЙ НАБЛЮДЕНИЯМИ
ПЕРИОД СОХРАНЕНИЯ ИММУНИТЕТА
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ КОНВАСЭЛ®
СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО
ГОДА.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРЕПАРАТОМ
КОНВАСЭЛ
® ФОРМИРУЕТ ГУМОРАЛЬНЫЙ И
КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНИТЕТ,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ РАЗВИТИЮ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,
ВЫЗЫВАЕМОЙ ВИРУСОМ SARS-
COV-2



200 ЭКЗ.



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


“КОНВАСЭЛ”
ВАКЦИНА ПРОТИВ
COVID-19 ВТОРОГО
ПОКОЛЕНИЯ



УЗ “ЧЕРИКОВСКИЙ РАЙЦГЭ”
2025

ПОЧЕМУ КОНВАСЭЛ®?

ВАКЦИНА КОНВАСЭЛ ПРИНЦИПИАЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВАКЦИН ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ НАЦЕЛЕННЫ НА ВЫРАБОТКУ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ АНТИТЕЛ К ПОДВЕРЖЕННОМУ МУТАЦИИ S-БЕЛКУ ИСХОДНОГО ШТАММА КОРОНАВИРУСА.



ДЕЙСТВИЕ ВАКЦИНЫ КОНВАСЭЛ® НАПРАВЛЕНО НА НУКЛЕОКАПСИДНЫЙ N-БЕЛОК ВИРУСА SARS-COV-2, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ КОНСЕРВАТИВНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ШТАММОВ ВИРУСА, ЧТО ДЕЛАЕТ КОНВАСЭЛ® УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПАН-КОРОНАВИРУСНОЙ ВАКЦИНОЙ.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ О ВАКЦИНЕ:

1

СКОЛЬКО РАЗ НУЖНО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ КОНВАСЭЛ®?

ВАКЦИНА ВВОДИТСЯ ОДНОКРАТНО В ДОЗЕ 0,5 МЛ ВНУТРИМЫШЕЧНО В ВЕРХНИЮ ТРЕТЬ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛЕЧА. ПЕРИОД СОХРАНЕНИЯ ИММУНИТЕТА СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ ГОДА.

2

МОЖНО ЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ЛЮДЯМ СТАРШЕ 60 ЛЕТ?

ДА, ВАКЦИНА РАЗРЕШЕНА К ПРИМЕНЕНИЮ ЛЮДЯМ ОТ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ 60 ЛЕТ.

3

КАК БЫСТРО ФОРМИРУЕТСЯ ИММУНИТЕТ К COVID-19 ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ?

ВАКЦИНА ВВОДИТСЯ ОДНОКРАТНО В ДОЗЕ 0,5 МЛ ВНУТРИМЫШЕЧНО В ВЕРХНИЮ ТРЕТЬ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛЕЧА. ПЕРИОД СОХРАНЕНИЯ ИММУНИТЕТА СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ ГОДА.

ПОМИМО УНИВЕРСАЛЬНОСТИ, ВАКЦИНУ КОНВАСЭЛ® ОТЛИЧАЮТ:



ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЙ (АКИ, КИ), КОНВАСЭЛ® ЯВЛЯЕТСЯ НИЗКОРЕАКТОГЕННОЙ И НЕАЛЛЕРГЕННОЙ ВАКЦИНОЙ, ЧТО ДЕЛАЕТ КОНВАСЭЛ® ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ БУСТЕРНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, В Т.Ч. ТЯЖЕЛО ПЕРЕНЕСШИХ ВАКЦИНАЦИЮ ВЕКТОРНЫМИ (АДЕНОВИРУСНЫМИ) ИЛИ РНК-ВАКЦИНАМИ.



СОГЛАСНО НАУЧНЫМ ДАННЫМ, N-БЕЛОК ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ В АКТИВАЦИИ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА И ЭЛИМИНАЦИИ ВИРУСА ИЗ ОРГАНИЗМА, ПОЭТОМУ ВАКЦИНА КОНВАСЭЛ® ЭФФЕКТИВНА, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ИММУНИЗИРОВАННЫХ S-БЕЛКОВЫМИ ВАКЦИНАМИ, НО НЕПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19. У ТАКИХ ПАЦИЕНТОВ ОТСУТСТВУЕТ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ НА ДОМИНАНТНЫЙ N-БЕЛОК SARS-COV-2, И ОНИ НАХОДЯТСЯ В ГРУППЕ РИСКА.



В БОЛЬШИНСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ВАКЦИН (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОНВАСЭЛ®) ПРИСУТСТВУЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. НАЛИЧИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ В ВАКЦИНАХ ОПАСНО, НАПРИМЕР, ДЛЯ ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ АСТМОЙ. ЧУЖЕРОДНЫЕ МОЛЕКУЛЫ ДНК И РНК ЯВЛЯЮТСЯ АКТИВАТОРАМИ РЕЦЕПТОРОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ TLR3, TLR8 И TLR9 И МОГУТ СПРОВОЦИРОВАТЬ АУТОИММУННЫЕ РЕАКЦИИ. БЛАГОДАРИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ, НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ В ВАКЦИНЕ КОНВАСЭЛ® ОТСУТСТВУЮТ.